


## جرعات دواء الأستيامينوفين عن طريق الفم: خيارات الأقراص

### ملحوظات حول الجرعات:

- توجيهات مركز أي دبليو كي الصحي حول جرعات دواء الأستيامينوفين للأطفال للاستعمال العام:
  - عن طريق الفم: جرعة من 10 إلى 15 ملغ/كغ كل 4 إلى 6 ساعات وفق ما تقتضيه الحاجة
- الجرعات اليومية القصوى: جرعة 75 ملغ/كغ/اليوم أو 4 غرام/اليوم (الكمية الأقل) من جميع المصادر
- استخدم الأقراص المستديرة وليس الكبسولات

### الخيارات ضمن نطاق الجرعات مستخدمين قوة الأقراص المتاحة:

قوة القرص المستخدم هي **عادية** (قرص 1 = 325 ملغ)

الكمية المستخدمة من قرص 325 ملغ	الجرعة	وزن الطفل
¼ قرص = 	81.25 ملغ	5.5 – 8.3 كغ 12.1 – 18.3 رطل
½ قرص = 	162.5 ملغ	10.9 – 16.2 كغ 24 – 35.6 رطل
¾ قرص = 	243.75 ملغ	16.2 – 21.7 كغ 35.6 – 47.7 رطل
قرص واحد (1) = 	325 ملغ	21.7 – 32.5 كغ 47.7 – 71.5 رطل
1 ½ قرص = 	487.5 ملغ	32.5 – 40 كغ 71.5 – 88 رطل
2 قرص = 	650 ملغ	43.3 كغ وما فوق 95 رطل وما فوق

قوة القرص المستخدم **إكسترا** (قرص 1 = 500 ملغ)

الكمية المستخدمة من قرص 500 ملغ	الجرعة	وزن الطفل
¼ قرص = 	125 ملغ	8.4 – 12.5 كغ 18.4 – 27.5 رطل
½ قرص = 	250 ملغ	16.7 – 25 كغ 36.7 – 55 رطل
¾ قرص = 	375 ملغ	25 – 37.5 كغ 55 – 82.5 رطل
قرص واحد (1) = 	500 ملغ	33.3 كغ وما فوق 73.3 رطل وما فوق



### نصائح حول تناول الدواء:

- استخدم أداة تقسيم الأقراص (متاحة في الصيدليات المجتمعية)
- إسحق وامزج الجرعة مع كمية قليلة من الماء، العصير، القطر، المربي أو النوع الملائم من الطعام المهروس.

نوفمبر 2022

تنبيه: لا تعتبر هذه الوثيقة بديلاً عن استشارة أخصائيي الرعاية الصحية المؤهلين. فإوضاع المريض تتغير ومن المحتمل أن تصبح بعض المعلومات قديمة بسبب توفر أدلة حديثة أو حدوث تغيير في الممارسات. إن مركز أي دبليو كي الصحي لن يتحمل مسؤولية تحديث المعلومات بصورة مستمرة، أو أي أخطاء أو حذف و/أو أي نتائج ناجمة عن استخدام المعلومات خارج مركز أي دبليو كي الصحي.