

## 剂量说明：

- IWK acetaminophen（对乙酰氨基酚）儿童剂量指南，供一般性使用：
  - 口服：10 到 15 毫克/公斤/次，根据需要每 4 到 6 小时一次
- 最大每日剂量：75 毫克/公斤/天，或者 4 克/天（以较少者为准）包含所有来源
- 使用圆形片剂，而不是胶囊

## 在剂量范围内使用目前片剂强度的选择：

### 使用常规强度片剂 (1 片 = 325 毫克)

儿童体重	剂量	325 毫克片剂的数量
<b>5.5 – 8.3 公斤</b> 12.1 – 18.3 磅	81.25 毫克	 = ¼ 片
<b>10.9 – 16.2 公斤</b> 24 – 35.6 磅	162.5 毫克	 = ½ 片
<b>16.2 – 21.7 公斤</b> 35.6 – 47.7 磅	243.75 毫克	 = ¾ 片
<b>21.7 – 32.5 公斤</b> 47.7 – 71.5 磅	325 毫克	 = 1 片
<b>32.5 – 40 公斤</b> 71.5 – 88 磅	487.5 毫克	 +  = 1½ 片
<b>43.3 公斤</b> 95 磅 及以上	650 毫克	 +  = 2 片

### 使用超强强度片剂 (1 片 = 500 毫克)

儿童体重	剂量	500 毫克片剂的数量片
<b>8.4 公斤 – 12.5 公斤</b> 18.4 – 27.5 磅	125 毫克	 = ¼ 片
<b>16.7 – 25 公斤</b> 36.7 – 55 磅	250 毫克	 = ½ 片
<b>25 – 37.5 公斤</b> 55 – 82.5 磅	375 毫克	 = ¾ 片
<b>33.3 及以上</b> 73.3 磅 及以上	500 毫克	 = 1 片

## 使用技巧：

- 使用分药器（社区药店有货）。
- 压碎并与少量的水、果汁、糖浆、果酱或适当的泥状食物混合服用。



2022 年 11 月

**注意：**本资料并不打算代替咨询合格的卫生保健专业人员。患者的情况各不相同，有些信息可能因为最近的证据或实践的变化而变得过时。IWK 健康中心对这些信息的持续有效性、任何错误或遗漏和/或在 IWK 之外使用这些信息所产生的任何后果不承担任何责任。